

VERMIMAX[®]

USO VETERINÁRIO
VERMÍFUGO PARA CÃES

660 mg
e 1650 mg

VERMIMAX[®] é um anti-helmíntico com atividade contra formas larvais e adultas dos parasitas dos cães.

FÓRMULA:

Cada comprimido de 660 mg contém:

Praziquantel 50,0 mg
Pamoato de pirantel 144,0 mg
Febantel 150,0 mg
Excipiente q.s.p. 660,0 mg

Cada comprimido de 1650 mg contém:

Praziquantel 125,0 mg
Pamoato de pirantel 360,0 mg
Febantel 375,0 mg
Excipiente q.s.p. 1650,0 mg

INDICAÇÕES:

VERMIMAX[®] é um vermífugo indicado na prevenção e tratamento de parasitoses causadas pelas formas larvais e adultas de: *Ancylostoma braziliense*, *Ancylostoma caninum*, *Dipylidium caninum*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Joyeuxiella pasqualei*, *Mesocestoides spp.*, *Taenia hydatigena*, *Taenia multiceps*, *Taenia ovis*, *Taenia pisiformis*, *Taenia taeniaeformis*, *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Trichuris vulpis*, *Uncinaria stenocephala*.

APRESENTAÇÕES E MODO DE USAR:

VERMIMAX[®] possui 4 apresentações, podendo estas serem combinadas entre si:

- **Cartucho contendo 2 ou 4 comprimidos de 660 mg** (1 comprimido para cada 10 kg de peso corporal),
- **Cartucho contendo 2 ou 4 comprimidos de 1650 mg** (1 comprimido para cada 25 kg de peso corporal),
- Administrar por via oral 1 comprimido de 660 mg para cada 10 kg de peso corporal ou 1 comprimido de 1650 mg para cada 25 kg de peso corporal, em dose única. O comprimido pode ser misturado à ração ou carne, sendo bem tolerado e dispensando regime prévio. Repetir o tratamento a cada 3 (três) ou 6 (seis) meses, a critério do Médico Veterinário.

PESO DO ANIMAL	QUANTIDADE DE COMPRIMIDOS
até 2 kg	¼ comp. de 660 mg
2 a 5 kg	½ comp. de 660 mg
5 a 10 kg	1 comp. de 660 mg
10 a 15 kg	1 + ½ comp. de 660 mg
15 a 20 kg	2 comp. de 660 mg
20 a 25 kg	2 + ½ comp. de 660 mg ou 1 comp. de 1650 mg
25 a 30 kg	1 comp. de 1650 mg + ½ comp. de 660 mg
30 a 35 kg	1 comp. de 1650 mg + 1 comp. de 660 mg
35 a 40 kg	1 comp. de 1650 mg + 1 + ½ comp. de 660 mg
45 a 50 kg	2 comp. de 1650 mg

OBS: Respeitar a dosagem de um comprimido de 660 mg para cada 10 kg de peso corporal ou um comprimido de 1650 mg para cada 25 kg de peso corporal, independente da combinação de comprimidos a ser utilizada.

RECOMENDAÇÕES:

As fêmeas podem ser tratadas antes da cobertura e 10 dias antes do parto. O tratamento dos filhotes pode ser feito durante a lactação e após o desmame. A fêmea pode ser vermifugada ao mesmo tempo que os filhotes.

Para prevenir reinfestações por *Dipylidium caninum*, deve-se tratar o animal contra pulgas, pois estas são hospedeiras intermediárias desse helminto.

Consulte sempre um Médico Veterinário para se ter segurança do tratamento.

PRECAUÇÕES:

Não se recomenda o uso em animais debilitados, pois a ação farmacológica se torna mais pronunciada.

Não administrar o produto em conjunto com drogas colinérgicas, pela potencialização da toxicidade.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

CONSERVAR O PRODUTO EM LOCAL SECO E FRESCO, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR E FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8.101 em 16/01/2002.

Responsável Técnico:

Ricardo Lucas - CRMV-SP 5217

APRESENTAÇÃO:

Cartucho contendo 2 comprimidos de 660 mg cada

Cartucho contendo 4 comprimidos de 660 mg cada

Cartucho contendo 2 comprimidos de 1650 mg cada.

Cartucho contendo 4 comprimidos de 1650 mg cada.



PROPRIETÁRIO:

RHOBIFARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

Rua Calêndula, 250 - Jd Boa Vista
Hortolândia - SP - CEP: 13187-044

FONE (19) 3845-7033

CNPJ: 04.913.008/0001-08

Indústria Brasileira.

www.rhobifarma.com.br

FABRICANTE:

ALTHAIA S/A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

CNPJ: 48.344.725/0001-23